EQUATIONS DIFFERENTIELLES : BAC STI GM 1999

Equation différentielle du premier ordre et étude d'une fonction exponentielle.

Partie A

On donne les deux équations différentielles : $E_1 : y' = 3y$ et $E_2 : y' = 2y$.

1. Donner la solution générale de l'équation différentielle E_1 et celle de l'équation différentielle E_2 .

2. Soit f une fonction définie sur l'intervalle $]-\infty, +\infty[$ par : $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ où f_1 désigne une solution de l'équation différentielle E_1 et f_2 une solution de l'équation différentielle E_2 .

Déterminer $f(x)$ sachant que $f(0) = -2$ et $f'(0) = -3$.

Partie B

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]-\infty, +\infty[$ par $f(x) = e^{3x} - 3e^{2x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unités graphiques : 2 cm pour l'unité sur l'axe des abscisses et 1 cm pour l'unité sur l'axe des ordonnées).

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (On pourra factoriser e^{2x} dans $f(x)$).

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire une équation d'une asymptote (Δ) à (C).

c) Déterminer les coordonnées du point d'intersection A de la courbe (C) et l'axe des abscisses. Etudier la position relative de (C) par rapport à l'axe des abscisses.

2. Calculer $f'(x)$. Montrer que $f'(x)$ a même signe que $e^x - 2$.

3. Dresser le tableau de variations de f sur l'intervalle $]-\infty, +\infty[$.

4. Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point B d'abscisse 0.

5. Tracer la tangente (T) et la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie C

On appelle D le domaine du plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 3$.

1. Déterminer une primitive F de f sur l'intervalle $]-\infty, +\infty[$.

2. Calculer en cm^2 la valeur exacte de l'aire du domaine D.

Correction

Partie A

$$E_1 : y' = 3y \Leftrightarrow y' - 3y = 0$$

$$E_2 : y' = 2y \Leftrightarrow y' - 2y = 0$$

1. Les solutions de l'équation différentielle (E_1) sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f_1(x) = k_1 e^{3x}$ où k_1 est une constante réelle.

Les solutions de l'équation différentielle (E_2) sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f_2(x) = k_2 e^{2x}$ où k_2 est une constante réelle.

2. $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$

$$f(x) = k_1 e^{3x} + k_2 e^{2x} \text{ donc } f(0) = k_1 e^0 + k_2 e^0 = k_1 + k_2.$$

$$\text{Or } f(0) = -2 \text{ donc } k_1 + k_2 = -2$$

$$f'(x) = k_1 e^{3x} + 2k_2 e^{2x} \text{ donc } f'(x) = 3k_1 e^{3x} + 2k_2 e^{2x}. \text{ D'où } f'(0) = 3k_1 e^0 + 2k_2 e^0 = 3k_1 + 2k_2.$$

$$\text{Or } f'(0) = -3 \text{ donc } 3k_1 + 2k_2 = -3.$$

On a donc :

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = -2 \\ 3k_1 + 2k_2 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2k_1 - 2k_2 = 4 \\ 3k_1 + 2k_2 = -3 \end{cases}$$

En additionnant membre à membre on obtient : $k_1 = 1$.

On a donc $1 + k_2 = -2$. Soit $k_2 = -3$.

$$\text{Finalement : } \boxed{k_1 = 1, k_2 = -3, f(x) = e^{3x} - 3e^{2x}}$$

Partie B : $f(x) = e^{3x} - 3e^{2x}$

1. a) $f(x) = e^{2x} \times e^x - 3e^{2x} = e^{2x}(e^x - 3)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 3) = +\infty \text{ donc par produit } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

EQUATIONS DIFFERENTIELLES : BAC STI GM 1999

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{3x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3e^{2x} = 0$ donc par différence $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

On en déduit que la droite (Δ) d'équation $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote à (C) en $-\infty$.

c) L'abscisse du point d'intersection de (C) et de l'axe des abscisses est la solution de l'équation $f(x) = 0$.

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow e^{2x}(e^x - 3) = 0.$$

On sait que pour tout réel x , $e^{2x} > 0$

$$\text{Donc } f(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 3 = 0 \Leftrightarrow e^x = 3 \Leftrightarrow x = \ln 3.$$

Les coordonnées de A sont $(\ln 3 ; 0)$.

La position relative de (C) par rapport à l'axe des abscisses est donnée par le signe de $f(x)$. On a donc :

La courbe (C) est au-dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle $]-\infty; \ln 3]$ et au-dessus de cet axe sur l'intervalle $[\ln 3; +\infty[$.

2. $f'(x) = 3e^{3x} - 6e^{2x} = 3e^{2x} \times e^x - 6e^{2x} = 3e^{2x}(e^x - 2)$

Pour tout réel x , $3e^{2x} > 0$ donc f' est du signe de $e^x - 2$.

$$\text{D'où } f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x - 2 > 0 \Leftrightarrow e^x > 2$$

On sait que la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

$$\text{Donc } f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln(e^x) > \ln 2 \Leftrightarrow x > \ln 2.$$

3. Il en résulte du 2. le tableau de variation suivant :

x	$+\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	-	0	+
Variations de f	0	-4	$+\infty$

4. Une équation de la tangente T à (C) au point B

d'abscisse 0 est $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

$$f(0) = e^0 - 3e^0 = 1 - 3 = -2$$

$$f'(0) = 3e^0 - 6e^0 = 3 - 6 = -3$$

Conclusion : une équation de T est $y = -3x - 2$

5. Voir figure

Partie C

1. F est primitive de f. $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x} - \frac{3}{2}e^{2x}$

2. f est négative sur $[0; \ln 3]$ donc $A = - \int_0^{\ln 3} f(x) dx$.

$$A = - [F(\ln 3) - F(0)]$$

$$F(0) = \frac{1}{3}e^0 - \frac{3}{2}e^0 = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} = \frac{2}{6} - \frac{9}{6} = -\frac{7}{6}$$

$$\begin{aligned} F(\ln 3) &= \frac{1}{3}e^{3 \ln 3} - \frac{3}{2}e^{2 \ln 3} = \frac{1}{3}e^{\ln 3^3} - \frac{3}{2}e^{\ln 3^2} \\ &= \frac{1}{3}e^{\ln 27} - \frac{3}{2}e^{\ln 9} = \frac{1}{3} \times 27 - \frac{3}{2} \times 9 = 9 - \frac{27}{2} \\ &= \frac{18}{2} - \frac{27}{2} = -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

$$A = - \left[-\frac{9}{2} - \left(-\frac{7}{6} \right) \right] = - \left[-\frac{27}{6} + \frac{7}{6} \right] = \frac{20}{6}. \text{ Conclusion : } A = \frac{10}{3} \text{ u.a.}$$

Or $1 \text{ u.A} = 2 \text{ cm}^2$ donc $A = \frac{20}{3} \text{ cm}^2$

Il fallait savoir résoudre une équation différentielle, étudier une fonction exponentielle et calculer une aire.