Exercice n°1 : $z_1 = 3 \left[\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right]$, $z_2 = \bar{z}_1$, $z_3 = -z_1$, $z_4 = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$, $z_5 = 3 \left[\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right]$

1. Forme algébrique des nombres complexes z_1 , z_2 et z_3 :

$$z_1 = 3 \left[\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right] = 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \times \frac{1}{2} \right) \text{ donc } \boxed{z_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i}$$

$$z_2 = \bar{z}_1 \text{ donc } \boxed{z_2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i}$$

$$z_3 = -z_1 \text{ donc } \boxed{z_3 = -\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i}$$

$$z_5 = 3 \left[\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right] = 3 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \times \frac{1}{2} \right) \text{ donc } \boxed{z_5 = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i}$$

2. Module et argument des nombres complexes z_2 , z_3 et z_4 :

$$\diamond z_2 = \bar{z}_1.$$

$$z_1 = 3 \left[\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right] \text{ donc } |z_1| = 3 \text{ et } \arg(z_1) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

Propriété : **deux nombres complexes conjugués ont des modules égaux et des argument opposés.**

donc $|z_2| = |z_1| = 3$ et $\arg(z_2) = -\arg(z_1) = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ où k est un entier relatif.

$$\text{Conclusion : } \boxed{|z_2| = 3 \text{ et un argument de } z_2 \text{ est } -\frac{\pi}{6}.$$

Autre méthode :

$$z_2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i.$$

$$|z_2| = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{27}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{36}{4}} = \sqrt{9} = 3.$$

$$\text{Soit } \theta_2 \text{ un argument de } z_2 : \cos \theta_2 = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta_2 = \frac{-\frac{3}{2}}{3} = -\frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Conclusion : } \boxed{\text{le module de } z_2 \text{ est } 3 \text{ et un argument de } z_2 \text{ est } -\frac{\pi}{6}.$$

$\diamond z_3 = -z_1 = -1 \times z_1$ donc $|z_3| = |-z_1| = |z_1| = 3$ et $\arg(z_3) = \arg(-1) + \arg(z_1) + 2k\pi$ où k est un entier relatif.

$$\arg(z_3) = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi.$$

Autre méthode :

$$z_3 = -\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i.$$

$$|z_3| = \sqrt{\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{27}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{36}{4}} = \sqrt{9} = 3.$$

$$\text{Soit } \theta_3 \text{ un argument de } z_3 : \cos \theta_3 = \frac{-\frac{3\sqrt{3}}{2}}{3} = -\frac{3\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta_3 = \frac{-\frac{3}{2}}{3} = -\frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Conclusion : } \boxed{\text{le module de } z_3 \text{ est } 3 \text{ et un argument de } z_3 \text{ est } -\frac{5\pi}{6} \text{ ou } \frac{7\pi}{6}.$$

$$\diamond z_4 = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ On remarque que } z_4 = 1 \times \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right].$$

$$\text{Conclusion : } \boxed{\text{le module de } z_4 \text{ est } 1 \text{ et un argument de } z_4 \text{ est } \frac{2\pi}{3}.$$

3. Les points A, B, C et D ont pour affixes respectives z_1 , z_2 , z_3 et z_5 .

a) $OA = |z_1| = 3$. $OB = |z_2| = 3$. $OC = |z_3| = 3$. $OD = |z_5| = 3$
 Donc A, B, C et D sont sur le cercle de centre O et de rayon 3.

b) On trace le cercle de centre O et de rayon 3 unités soit 6 cm.

Sur le cercle on place les points A $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}\right)$ B $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}; -\frac{3}{2}\right)$; C $\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}; -\frac{3}{2}\right)$

et D $\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}\right)$. voir figure ci contre .

c) $AC = |z_3 - z_1|$, $z_3 - z_1 = -z_1 - z_1 = -2z_1$ donc

$$z_3 - z_1 = -2z_1 = -2\left(\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i\right) = -3\sqrt{3} - 3i$$

$$|z_3 - z_1| = |-2z_1| = |2z_1| = 2 \times 3 = 6.$$

Conclusion : $AC = 6$.

$$BD = |z_5 - z_2|, z_5 - z_2 = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i - \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i\right) = -2 \times \frac{3\sqrt{3}}{2} + 3i = -3\sqrt{3} + 3i,$$

$$\text{donc } |z_5 - z_2| = \sqrt{(-3\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6.$$

Conclusion : $\boxed{BD = AC = 6}$.

d) L'affixe du milieu de [BD] est $\frac{z_2 + z_5}{2} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i - \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i}{2} = \frac{0}{2} = 0$. Donc O est le milieu de [BD].

De même L'affixe du milieu de [AC] est $\frac{z_1 + z_3}{2} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i - \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i}{2} = \frac{0}{2} = 0$. Donc O est le milieu de [AC].

Les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu donc ABCD est un parallélogramme.

De plus $AC = BD$ donc les diagonales du parallélogramme ABCD ont même longueur.

Conclusion : ABCD est un rectangle.

Exercice n°2 : Soit le polynôme $P(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2$

1°) $P(-1) = -2 - 1 + 5 - 2 = 0$.

Donc $P(x)$ est factorisable par $x + 1$ et $P(x) = (x + 1)(2x^2 + bx - 2)$ où b est un réel à déterminer.

On développe pour trouver b :

$$(x+1)(2x^2 + bx - 2) = 2x^3 + bx^2 - 2x + 2x^2 + bx - 2 = 2x^3 + (b+2)x^2 + (-2+b)x - 2$$

Par identification des polynômes on obtient :

$$b + 2 = -1 \text{ et } -2 + b = -5, \text{ d'où } b = -3.$$

Finalement $\mathbf{P(x) = (x+1)(2x^2 - 3x - 2)}$

2°) $P(x) = 0 \Leftrightarrow (x+1) = 0$ ou $2x^2 - 3x - 2 = 0$

Soit Δ le discriminant de $2x^2 - 3x - 2$: $\Delta = 9 + 16 = 25$

$$\Delta > 0 \text{ donc } 2x^2 - 3x - 2 \text{ a deux racines : } x' = \frac{3-5}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \text{ ou } x'' = \frac{3+5}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

Conclusion : $\boxed{P(x) = 0 \text{ a trois solutions } -1, 2, -\frac{1}{2}}$

3°)

$$2\sin^3 x - \sin^2 x - 5\sin x - 2 = 0 \Leftrightarrow 2\sin^3 x - \sin^2 x - 5\sin x - 2 = 0$$

On pose $X = \sin x$

$$\text{On obtient } 2X^3 - X^2 - 5X - 2 = 0$$

On retrouve l'équation du 2°) donc $X = -1$ ou $X = 2$ ou $X = -0,5$.

$$\text{On en déduit que } \sin x = -1 \text{ ou } \sin x = 2 \text{ ou } \sin x = -\frac{1}{2}$$

$\sin x = -1$ a pour solution tout nombre de la forme $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ où k est un entier relatif.

$\sin x = 2$ n'a pas de solution car un sinus est toujours compris entre -1 et 1 .

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Finalement } \mathbf{S = \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

Les solutions sont représentés par les points A, E et F sur le cercle ci-dessus